

I risultati del Piano Nazionale Esiti, relativamente all'anno 2017, mostrano gli indicatori di outcome distinti per presidio dell'Azienda

Nota di metodo PNE

Negli studi osservazionali la valutazione comparativa degli esiti deve tenere conto delle possibili disomogeneità esistenti nelle popolazioni studiate, dovute a caratteristiche quali età, genere, gravità della patologia in studio, presenza di comorbidità croniche, etc. Questi fattori possono agire come confondenti dell'associazione tra esito ed esposizione, pertanto nel rapporto è stato effettuato un aggiustamento degli indicatori attraverso l'utilizzo di metodi di risk adjustment. Questi permettono di studiare le differenze tra strutture e/o aree territoriali (esprese in termini di RR), "al netto" del possibile effetto confondente della disomogenea distribuzione delle caratteristiche dei pazienti.

Alcuni indicatori di outcome distinti per presidio- Piano Nazionale Esiti (anno 2017)

Area clinica	Indicatore	Presidio UMBERTO I		Presidio LANCISI		Presidio SALESI	
		% GREZZA	% ADJ	% GREZZA	% ADJ	% GREZZA	% ADJ
CARDIOCIRCOLATO RIO	Infarto Miocardico Acuto: mortalita' a 30 giorni	5,86%	6,94%	5,26%	5,34%		
	Infarto Miocardico Acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	49,10%	45,25%	68,42%			
	Scompensazione cardiaca congestizia: mortalita' a 30 giorni	1,69%	2,06%	0,00%			
	By-pass Aortocoronarico: mortalita' a 30 giorni	0,85%	0,90%	0,85%	0,83%		
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalita' a 30 giorni	0,33%	0,31%	0,41%	0,41%		
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalita' a 30 giorni	0,00%		1,47%	1,32%		
NERVOSO	Ictus ischemico: mortalita' a 30 giorni	2,87%	3,91%				
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalita' a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	3,07%	3,26%				
RESPIRATORIO	BPCO riacutizzata: mortalita' a 30 giorni	2,16%	2,61%				
CH. GENERALE	Colecistectomia laparoscopica: % ricoveri con degenza post-operatoria < 3 giorni	71,43%	73,50%				
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attivita' > 90 casi	88,57%					
CHIRURGIA ONCOLOGICA	Intervento chirurgico per TM mammella: % interventi in reparti con volume di attivita' > 135 casi	99,26%					
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 giorni da un intervento chirurgico conservativo per tumore maligno	14,25%	12,79%				
	Intervento chirurgico per TM polmone: mortalita' a 30 giorni	0,00%					
	Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalita' a 30 giorni	4,12%	5,35%				
	Intervento chirurgico per TM colon: mortalita' a 30 giorni	1,87%	2,15%				
GRAVIDANZA E PARTO	Proporzione di parti con taglio cesareo primario					28,73%	21,30%
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio					0,67%	0,65%
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio					0,55%	0,46%
OSTEOMUSCOLARE	Frattura del collo del femore: intervento chirurgico entro 2 giorni	70,08%	72,28%				
	Frattura della Tibia e Perone: tempi di attesa per intervento chirurgico	5					